УДК 618.5-089.5:618.1

Абазова И.С., Тутуков И.С., Шомахова Б.Ю., Кабалоева М.В.
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР, г.Нальчик
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова»,
г.Нальчик

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ

Под критическим состоянием следует понимать крайнюю степень любой, в том числе ятрогенной, патологии, при которой требуется искусственное замещение или поддержание жизненно важных функций, т.к. собственные компенсаторные механизмы оказываются несостоятельными [2].

При общей тенденции в медицине к профилизации и самостоятельности направлений провести четкую грань между анестезиологией, реаниматологией, неотложной медициной оказалось весьма сложно, особенно при ориентации не на организационные рамки, а на их содержание. Они взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга [1]. В экстремальных условиях неотложная помощь на догоспитальном этапе рассматривается в качестве важнейшей составной части реаниматологической помощи. Наоборот, разработанная в стране в последние годы концепция развития системы скорой помощи, ориентированная на повседневную практику, в определенной мере распространяется и на анестезиологическую помощь, и на интенсивную терапию в стационарах. Более того, когда анестезия у тяжелообольного или пострадавшего, очень трудно провести грань между анестезиологией и реаниматологией, тем более что в прикладном аспекте они являются составными частями единой специальности.

Ключевые слова: анестетики, бензодиазепины, кетамин, инфузионная терапия, сочетанная травма, черепно-мозговая травма.

ВВЕДЕНИЕ

При сочетанных травмах задачей анестезиолога-реаниматолога является оптимизация условий функционирования ЦНС и других важных органов и систем пострадавшего.

Первоочередной задачей является диагностика нарушений гемодинамики и дыхания, а также, их скорейшая коррекция. У пострадавших с наличием ЧМТ оценка тяжести церебрального повреждения проводится по стандартизированным схемам, наиболее распространенной и часто употребляемой из которых является Шкала комы Глазго[1].

Сложность проведения адекватной предоперационной оценки и самого анестезиологического пособия у пострадавшего с сочетанной травмой обусловлена поражением не только ЦНС, но и других органов и систем.

Клиническая часть. Кратко рассмотрим основные моменты различных вариантов сочетанной ЧМТ.

ЧМТ и скелетная травма. Сочетание ЧМТ с переломами трубчатых костей является одним из наиболее частых вариантов сочетанной травмы. Шок и жировая эмболия являются основными осложнениями у пострадавших с этим вариантом сочетанной травмы. Объем инфузионной терапии у пострадавших с шоком должен быть ориентирован на восполнение объема циркулирующей крови (ОЦК).

Из инфузионных растворов оптимальным является сочетание кристаллоидов и коллоидов, а с учетом интракраниальных поражений – гипертонический раствор натрия хлорида. Жировая эмболия церебральных сосудов может обусловить развитие очаговой неврологической симптоматики, однако чаще страдают лёгкие, причем развитие дистресс-синдрома может наблюдаться крайне быстро [6]. Имобилизация сломанных конечностей, обезболивание и немедленный остеосинтез в условиях общей анестезии – основа профилактики развития осложнений.

Крайне неблагоприятной ситуацией является сочетание **ЧМТ и спинальной травмы**, в особенности, шейного отдела позвоночника. Даже у пострадавших с предположительно изолированной ЧМТ анестезиолог должен быть крайне осторожным в отношении скрытой травмы шейного отдела позвоночника с её нестабильностью. Наибольший риск таких больных представляет интубация трахеи. Разумными альтернативами в этой ситуации является проведение интубации трахеи с внешней мануальной фиксацией или выполнение трахеостомии, применение интубации трахеи по бронхоскопу. Пострадавшие с сочетанной **ЧМТ и лицевой травмой** также могут представлять определенные проблемы. Частота обструкции верхних дыхательных путей у таких пациентов достаточно высока, а проведение масочной вентиляции зачастую просто неосуществима. Трахеостомия у таких пациентов является наиболее предпочтительной, в особенности при прогнозе необходимости длительной ИВЛ [4].

Сочетание поражения внутренних органов существенно отличается в зависимости от механизма повреждения. При закрытой травме поражение внутренних органов имеет распространенный характер, а при проникающих ранениях – сконцентрирована вокруг раневого канала.

Главным условием проведения адекватного анестезиологического обеспечения у пострадавших с сочетанной травмой является наличие у анестезиолога достаточных знаний по патофизиологии как интракраниальной системы, так и других органов и систем организма в условиях травматической болезни. Это позволяет анестезиологу правильно оценить состояние пострадавшего, выбрать адекватную схему индукции и поддержания анестезии и инфузионно-трансфузионной терапии, прогнозировать, быстро диагностировать и эффективно корректировать развивающиеся осложнения [3].

Премедикация – это комплекс лекарственных препаратов, который вводится до индукционного агента с целью уменьшения или предотвращения нежелательных реакций.

Индукция анестезии и интубация трахеи являются важнейшими этапами анестезиологического пособия. При выборе лекарственных препаратов необходимо учитывать, что все ингаляционные анестетики вызывают, несмотря на депрессию церебрального метаболизма, значительное увеличение минутного кровотока, внутричерепного объема крови и повышение внутричерепного давления. Все внутривенные анестетики, за исключением кетамина, наоборот, вызывают снижение минутного кровотока, метаболизма, внутричерепного объема крови и внутричерепного давления [1,7].

К сожалению, все анестетики, используемые в индукционных дозах, вызывают достаточную депрессию системной гемодинамики. Исключение составляет кетамин, который при сочетании с бензодиазепинами является препаратом выбора для индукции анестезии у пострадавших с нестабильной гемодинамикой. У пациентов без выраженных гемодинамических нарушений предпочтительнее комбинация барбитуратов или бензодиазепинов с наркотическими анальгетиками. Барбитураты и бензодиазепины оказывают положительное влияние на центральную нервную систему, а включение в схему индукции наркотических анальгетиков позволяет у большинства пациентов эффективно блокировать прессорную реакцию на ларингоскопию и интубацию трахеи. Проведение интубации трахеи может представлять определенную проблему у пострадавших с сочетанной травмой. Во первых, это наличие полного желудка, риск регургитации с последующим развитием тяжело протекающих аспирационных пневмоний. Введение желудочного зонда через рот провоцирует натуживание и кашель, что отрицательно оказывает на интракраниальную систему (повышение ВЧД). Введение желудочного зонда противопоказано через один из носовых ходов даже при подозрении на перелом основания черепа. Простым и эффективным методом является применение приёма Селика [4].

Задачи инфузионной терапии у пострадавших с сочетанной травмой сводится к

к четырём основным моментам:

1. Поддержание объёма циркулирующей крови;
2. Поддержание кислородно-транспортной функции крови;
3. Поддержание водно-электролитного баланса и коррекция его выраженных нарушений;
4. Умеренная дегидратация мозгового вещества и профилактика отека мозга.

Целями инфузионной противошоковой терапии отвечают ГЭК и декстраны. Предпочтительнее использовать декстраны, т.к. они обладают ингибирующим действием как на механизмы активации каскадного ответа организма, так и на лейкоцитарно-эндотелиальное взаимодействие[5]. Считается, что декстран является самым безопасным плазмозаменителем. Принцип терапии при помощи малых объёмов гипертонических растворов представляется весьма ценным, т.к. приводит к быстрому и эффективному перераспределению жидкости из внутриклеточного и интерстициального сектора в сосудистое русло. Возникающая гемоделиция и снижение вязкости крови улучшает венозный возврат и повышает преднагрузку. Одновременно уменьшается постнагрузка вследствие сосудорасширяющего эффекта, присущего гипертоническому раствору. За счет этих благоприятных эффектов увеличивается сердечный выброс и обеспечивается стабилизация гемодинамики. Эффект гипертонического раствора носит кратковременный характер.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным отделений анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР за 2021гв отделение поступило 237 пострадавших с сочетанной травмой, из них в крайне тяжелом состоянии 128. Переведены с улучшением в отделение сочетанной травмы – 159, летальный исход – 44. Прооперировано пациентов с сочетанной травмой – 193, из них с ЧМТ – 79. Летальный исход на операционном столе – 2 пострадавших в связи с травмой несовместимой с жизнью.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Полушин Ю.С. Анестезиология и реаниматология руководство для врачей, Спб., 2004.- С. 460-463, 691-695
2. Зильбер А.П. Медицина критических состояний: общие проблемы. – Петрозаводск: Издательство ПГУ, 1995. – 360с.
3. Абазова И.С., Жашуева Л.Ю., Кишев А.Х. и др. Анализ проведенной инфузионно-трансфузионной терапии при тяжелой сочетанной травме Материалы первого конгресса анестезиологов и реаниматологов Юга России, Ростов/Дону, 2014.- С.8-12
4. Крылов В.В., Петриков С.С., Белкин А.А. Лекции по нейрореанимации.-М.: Медицина, 2009. – С.17-18
5. Купер Н., Форрест К., Крэмп П. неотложные состояния. Принципы коррекции// Пер. с англ. – М.: Медицинская литература, 2008.- 216с.
6. Kretschmer V. Einfluss niedermolekularer Hydroxyethylstarke unterschiedlicher Ausgangssubstanz auf die Hamostase // Inaugural-dissertation. Zur Erlangung des Doktorgrades der gesamten Medizin dem Ffchereich Humanmedizin der Philipps-Universitat Marburg vorgelegt von Susanne Karopka aus Brilot Varburg, 2006
7. Zandler R. Fluid Managemtnt // Medizinisch Verlagsgesellschaft mbh. – Melsungen. – 2006.

Сведения об авторах

Абазова И.С., кмн, заведующая отделением анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР, доцент кафедры общей хирургии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова».
Адрес: 360004, Кабардино-Балкария, г.Нальчик, ул.Ногмова,93.
Email: abazova_inna@mail.ru

Тутуков А.Б., кмн, заведующий
торакальным отделением
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ КБР, доцент кафедры
общей хирургии медицинского
факультета
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М.Бербекова».
Адрес: 360004, Кабардино-Балкария,
г.Нальчик, ул.Ногмова,93.
Email: tutukovab@mail.ru

Шомахова Б.Ю., кмн, заведующая отделе-
нием эндоскопии ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ КБР, доцент
кафедры госпитальной хирургии ГБУЗ
«Республиканская клиническая больница»
МЗ КБР, доцент кафедры
общей хирургии медицинского
факультета
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М.Бербекова».
Адрес: 360004, Кабардино-Балкария,
г.Нальчик, ул.Ногмова,93.
Email:bismella@newmail.ru

Кабалоева М.В., врач
анестезиолог-реаниматолог
отделения
анестезиологии-реанимации
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ КБР. Адрес: 360004,
Кабардино-Балкария, г.Нальчик,
ул.Ногмова,93.
Email:tamikstar@rambler.ru